

## LOPHOLEUCASPIS JAPONICA COCKRELL

Par M. KAUSSARI et G. FARAHBAKHCH

Le genre *Lopholeucaspis* créé par Balachowsky (*Parlatorini* — *Leucaspidina*) diffère du genre *Leucaspis* par différents caractères, notamment par la présence d'une rangée régulière et continue de tubercules glandulaires dans la zone pleuro — ventral du corps. Ces tubercules sont disposés, à chaque côté du corps, dans un seul rang depuis la zone cephalique jusqu'au niveau du segment IV de l'abdomen ou jusqu'au pygidium .

*L. japonica* est une espèce polyphage causant des dégâts très importants aux plantations, se localisant sur le tronc, les branches et les petits rameaux du Citrus en Turquie, un grand nombre des arbres et plantes cultivés comme *Pommier*, *Cytisus* sp., *Citrus*, *Pivoine*, *Erable*, *Magnolia* au Japon, sur *Ficus religiosa* en Bengale et *F. orbicularis* en Australie.

Cette espèce a été signalée par KAUSSARI, vivant sur *Ficus bengalensis* (1956) au sud de l'Iran sur le littoral de la mer OMAN (TIS).

Récemment cette cochenille a été trouvée par ARAHBAKHCH sur *Pommier ornamental*, *Magnolia*, *Syringa vulgaris*, *Salix aegyptiaca* au bord de la mer Caspienne (RAMSAR).

### Bibliographie

BALACHOWSKY, A.S. (1953). Les cochenilles de France, d'Europe, du Nord de l'Afrique et du Bassin Méditerranéen (Vol.VIII).

BORKHSENIUS, N.S. (1950). Les cochenilles de l' URSS. AKADEMI NAOUK, Moscou-Léningrad.

FERRIS, G.F. (1938). Atlas of the scale insects of North America, series. II.

FERRIS, G.F. (1941). Atlas of the scale insects of North America, series III.