

VORASPIS ADLEI BALACHOWSKY et KAUSSARI

Par . M . Kaussari

Le genre *Voraspis* a été créé par W. J. HALL sur 3 espèces afro — éthiopiennes .

On peut séparer ce genre des genres voisins, *Rolaspis* Hall et *Tecaspis* Hall, par les caractères suivants .

1 . la présence d'une double rangée de macropores dorsaux submarginiaux et submédians sur les segments II à V inclus .

2 . Existence de macropores marginaux sur VI et VII (ou VIII), au nombre de plus de 3 éléments avec présence fréquente d'éléments submarginiaux sur les mêmes segments .

3 . Macropores submédians toujours présents sur VI .

Ce genre comprend jusqu 'ici deux espèces connues dans les régions paléarctiques (l 'afrique du Nord) , ce sont : *V. nerii* NEWS., vivant sur *Nerium oleander* et *V. ceratonia* Marchal , vivant sur *Ceratonia siliqua* et arganier . La troisième espèce *V. Adlei* BALACHOWSKY. et KAUSSARI a été trouvé par Kaussari et Remaudière dans le sud de l' IRAN sur abricotier .

Cette espèce diffère de deux espèces connues africaines par une série de caractères notamment la structure de L_1 qui sont robustes, enfoncées dans la marge pygidiale, divergentes, à bord externe très réduit, bord interne long, finement serratulé, accolées l'une à l'autre seulement par une membrane interne sclérosée et aussi par la présence d'une double rangée de macropores dorsaux submarginiaux et submédians sur les segments III, IV, et V dont la deuxième rangée est inégale .

Cette espèce est dédiée à AHMAD HOSSEIN ADLE, ancien ministre de l' agriculture, en hommage de reconnaissance pour toute l' aide et le service rendu à l' agriculture de l' IRAN au cours de sa vie .

BIBLIOGRAPHIE

BALACHOWSKY A. S. . Les cochenilles paléarctiques de la tribu des DIASPIDINI, Institut Pasteur, 1954 .

BALACHOWSKY A. S. et KAUSSARI, M. . Bolletino del Laboratorio di Entomologia Agraria «Filippo Silvestri» di Portici, Vol. XIV, 1956 .