

گزارش‌های کوتاه علمی

گزارش جدید جنس *Strongylopsis* و چهار گونه از زنبورهای زیر خانواده *Pimplinae* از ایران (Hym., Ichneumonidae); مهندس اشکان مستندی یزدی نژاد. بخش تحقیقات رده بندی حشرات، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صندوق پستی ۱۴۵۴، تهران ۱۹۳۹۵، ایران. amasnadi@yahoo.com

طی بررسی تعدادی از نمونه‌های زنبور موزه حشره‌شناسی هایک میرزاپانس در بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تعداد یک جنس و چهار گونه از زنبورهای خانواده Ichneumonidae متعلق به زیر خانواده *Pimplinae* شناسائی گردید. این اولین گزارش از وجود این ۴ گونه و ۱ جنس در ایران می‌باشد. موارد شناسائی شده توسط دکتر Riedel از آلمان و دکتر Jussila از فنلاند تأیید شدند. شناسائی گونه ۲ گونه از Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) در حد ۱۹۵۰ در حد ۱۸۲۹ و Exeristes ruficollis (Gravenhorst, 1829) در حد ۱۷۶۳ توسط Gregopimpla inquisitor (Scopoli, 1763) توسط دکتر Riedel از آلمان صورت پذیرفت و شناسائی گونه (Gravenhorst, 1829) Itoplectis melanocephala بدن به طول ۱۰ میلی‌متر، طول بال جلو و عقب به ترتیب ۶ و ۳ میلی‌متر است. سر، صورت و سینه در هر دو جنس کاملاً سیاه رنگ. ناخن‌های پنجه پای جلو در افراد ماده دارای دندانه و ناخن‌های پنجه پای میانی و عقبی و تمام ناخن‌های پا در افراد نر ساده می‌باشد. پاها نارنجی رنگ هستند به غیر از پیش‌ران (coax) پای جلو که سیاه می‌باشد. تخم ریز در افراد ماده کشیده و مستقیم است (Morley, C. 1946. Transactions of the Suffolk Naturalists' Society. 5 (1945): 201).

تاریخ جمع آوری: همدان، دره مرادیک، ۱۳۷۴/۶/۷، جمع آوری کنندگان: میرزا یانس و بدیعی.
گونه ۱۹۵۰ *Strongylopsis belua* Kuzin، بدن به طول ۸ میلی متر، طول بال جلو و عقب
بترتیب ۶ و ۴ میلی متر است. صورت پهن و محدب که بخصوص در افراد ماده در قسمت بالا
کمی حالت برآمده دارد. *Clypeus* کشیده و پهن و با شیاری ضعیف از صورت جدا شده
است. سینه فشرده و پا در افراد ماده کوتاه و قوی. تخم ریز غلافی بسیار کوتاه دارد که از انتهای
شکم تجاوز نمی‌کند (Kuzin, B. S. 1950. Entomologicheskoye Obozreniye. 31: 247-253).
محل و تاریخ جمع آوری: گلستان، پارک ملی گلستان- سولگرد، ۱۳۸۰/۵/۷، جمع آوری
کنندگان: غیورفر. جنس ۱۸۹۶ *Strongylopsis* Brauns، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.
گونه ۱۸۲۹ *Exeristes ruficollis* (Gravenhorst)، بدن به طول ۷ میلی متر، طول بال جلو و
عقب به ترتیب ۵/۵ و ۴/۶ میلی متر است. بدن نسبتاً کشیده، صورت و *Clypeus* سیاه رنگ
است. شیار پس سری (Occipital carina) در قسمت میانی ضخیم شده است. *Mesoscutum*
دارای موهای پراکنده است. ناخن‌های پا در افراد ماده فاقد basal lobe می‌باشد. تخم ریز
کشیده، استوانه‌ای شکل و دارای بریدگی nodus در انتهایها و تعدادی دندانه در قسمت زیر
Fitton, M. G., Shaw, M. R. & Gauld, I. D., 1988. Handbook for the Identification of ()
می‌باشد. (British Insects. 7: 1-11). محل و تاریخ جمع آوری: مرکزی، آشتیان، دره بید سوخته،
جمع آوری کنندگان: براری و مفیدی. ۱۳۷۶/۵/۲۸
گونه ۱۷۶۳ *Gregopimpla inquisitor* (Scopoli)، بدن به طول ۷ میلی متر، طول بال جلو و
عقب به ترتیب ۵/۵ و ۳ میلی متر است. سر، سینه و شکم سیاه رنگ است. رگبال Nervellus در
قسمت واقع شده در ناحیه میانی و دو پنجم انتهایی قطع شده است. *Propodeum* در مقطع
عرضی نسبتاً شدید محدب است. تخم ریز بلند، به طول mm ۶/۵ و تقریباً به اندازه طول بدن
می‌باشد (Kasparyan, D. R. 1981. Opredeliteli Faune SSSR. 129: 41-97). محل و تاریخ
جمع آوری: تهران، دماوند، ۱۳۴۹/۵/۱۳، جمع آوری کنندگان: صفوفی و هاشمی.