

بررسی پتانسیل آللوباتی شبدر ایرانی (*Trifolium resupinatum*) و
بررسیم (*T. alexandrium*) بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک،
تاج‌خرروس، چاودار و خردل وحشی

Study of allelopathic potential of *Trifolium resupinatum* and *T. alexandrium*
on seed germination of *Convolvulus arvensis*, *Amaranthus retroflexus*,
Secale cereale and *Sinapis arvensis*

فریبا میقانی^{*}، جواد خلقانی^۱، مدلقا قربانی^۲ و مرتضی نجف‌پور^۲

۱- بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
صندوق پستی ۱۴۵۴، تهران ۱۹۳۹۵

۲- دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
(تاریخ دریافت: اسفند ۱۳۸۳، تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۸۴)

چکیده

به منظور بررسی توانایی اندام‌های هوایی شبدر ایرانی و بررسیم در کنترل جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خرروس، چاودار و خردل وحشی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش، بخش هوایی دو گونه شبدر در مرحله گلدهی جمع‌آوری و خشک شد. از ماده خشک بدست‌آمده، دو نوع عصاره آبی (با آب مقطر) و آلی (با متابول) تهیه و سپس از هر نوع عصاره سه غلظت ۳۳۳ گرم در لیتر (غلظت کامل یا ۱۰۰ درصد)، ۱۶۷ گرم در لیتر (۵۰ درصد غلظت کامل) و ۸/۳ گرم در لیتر (۲۵ درصد غلظت کامل) تهیه شد و آب مقطر نیز به عنوان شاهد (غلظت صفر عصاره) مورد استفاده قرار گرفت. بذر علف‌های هرز مذکور در ظروف پتی محتوى اين عصارهها قرار

* Corresponding author: fmaighany@yahoo.com

گرفتند و پس از دو هفته در صد جوانه‌زنی آن‌ها تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره‌های آبی و آلی، در صد جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز کاهش یافت. بیشترین اثر بازدارندگی عصاره‌های آبی و آلی شبدر ایرانی و بر سیم بر جوانه‌زنی بذر خردل وحشی مشاهده شد و جوانه‌زنی بذر پیچک کمتر از سایر علف‌های هرز تحت تأثیر قرار گرفت. عصاره آلی در مقایسه با عصاره آبی اثرات بازدارندگی بیشتری بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز داشت. همچنین شبدر ایرانی در مقایسه با شبدر بر سیم، بازدارنده قوی‌تر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز بود. بنابراین، بنظر می‌رسد که مقدار آللوکمیکال‌های این دو گونه شبدر، با یکدیگر تفاوت قابل توجهی داشته و پیچک در مقایسه با سه گونه دیگر، نسبت به آللوکمیکال‌های این دو گونه شبدر مقاومت بیشتری دارد.

واژه‌های کلیدی: آللوپاتی، جوانه‌زنی بذر علف هرز، شبدر، *Trifolium spp.*

مقدمه

مطالعه گیاهان علوفه‌ای یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های علوم گیاهی است. علفزارها حدود ۲۵ درصد مساحت پوشش گیاهی دنیا را تشکیل می‌دهند. علوفه بعنوان ماده گیاهی که بیش از ۲۵ درصد وزن خشک آن را الیاف تشکیل می‌دهد، معروفی می‌شود. گیاهان علوفه‌ای در حاصلخیزی خاک نقش مهمی ایفا می‌کنند. آن‌ها قادرند حاصلخیزی و ساختمان خاک را حفظ کرده یا آن را بهبود بخشنند. این گیاهان می‌توانند موجب حفاظت خاک در برابر فرسایش آبی یا بادی نیز بشونند. اما با وجود این همه کاربردهای متعدد و با اهمیت، گیاهان علوفه‌ای چندان مورد توجه کشاورزان و محققان قرار نگرفته‌اند (Walton, 1992).

بهره‌گیری از گیاهان پوششی، بخش مهمی از عملیات کشاورزی به منظور کاهش فرسایش خاک و کنترل علف‌های هرز محسوب می‌شود (Arnon, 1999). این گیاهان علف‌های هرز را به چند روش کنترل می‌کنند:

- ۱- تراوش مواد شیمیایی دارای توانایی آللوپاتی
- ۲- تراوش آللوکمیکال‌ها بوسیله میکروب‌های همزیست آن‌ها
- ۳- سدهای فیزیکی و سایه‌افکنی ناشی از بقایای آن‌ها

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبدر ایرانی و برسمی بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی

۴- تغییر عوامل فیزیکی خاک مانند دما، pH و ظرفیت نگهداری آب
بنظر می‌رسد که عامل منحصر بفردی مسئول این کنترل نیست، بلکه یک یا چند عامل
تأثیرگذار هستند (Hoffman & Weston, 1996).

آللوپاتی به اثرات یک گیاه بر گیاه دیگر و یا میکروارگانیسم‌ها از طریق آزاد شدن مواد شیمیایی و متابولیت‌های حاصل از تجزیه آن‌ها اشاره می‌کند. این پدیده بصورت اثرات مفید یا مضر مستقیم و یا غیر مستقیم یک گیاه بر گیاه دیگر با واسطه تولید ترکیبات شیمیایی که در خاک آزاد می‌شوند، معرفی می‌گردد. مواد فیتو توکسی متعددی از بافت‌های گیاهی و خاک شناسایی شده‌اند که آللوکمیکال نام دارند. این مواد، فراورده‌های ثانوی گیاه محسوب می‌شوند (Challa & Ravindra, 1998). گیاهان متعددی از تیره لگومینه از جمله گیاهان علوفه‌ای مانند شبدر دارای فراورده‌های ثانوی با توانایی آلوپاتی هستند. این گیاهان ترکیباتی تولید می‌کنند که روی همه ارگانیسم‌ها از جانوران عالی تا حشرات، قارچ‌ها، باکتری‌ها و سایر گونه‌های زراعی اثر می‌گذارند. درباره اثر این مواد شیمیایی بر رشد گیاهان بررسی‌های محدودی صورت گرفته است (Qasem, 1994). در حال حاضر استفاده از گیاهان پوششی مانند شبدر برای کنترل علف‌های هرز، روش مناسبی معرفی می‌گردد (Rice, 1995). گیاهان زراعی متعددی مانند گندم، شبدر، سورگوم، خیار، چاودار و آفتابگردان، با استفاده از توانایی آلوپاتی قادر به کنترل علف‌های هرز هستند. این توانایی راهکار نویدبخشی برای مدیریت علف‌های هرز محسوب می‌شود. بعنوان مثال، شبدر بصورت مالچ زنده و بقایای آن پس از مرگ، برای کنترل علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبدر با کاشت ۷-۱۷ کیلوگرم در هکتار بر حسب نوع شبدر، علف‌های هرز را بطور چشمگیری کنترل می‌کند. عصاره آبی شبدر، رشد گیاهچه و جوانه‌زنی خردل وحشی را کاهش می‌دهد (Maighany, 2004). بدین ترتیب توجه روزافزونی به استفاده از لگومهای یکساله مانند شبدر برای کنترل علف‌های هرز به چشم می‌خورد (Masiunas et al., 1995).

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه توانایی آلوپاتی شبدر ایرانی و برسمی از نظر کنترل علف‌های هرز مشکل‌سازی مانند پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی بود. با این امید که نتایج پژوهش حاضر بتواند بعنوان پایه‌ای برای بهره‌گیری از بقایای این دو گونه

شبدر جهت کنترل علفهای هرز، مورد استفاده قرار گیرد.

روش بررسی

پس از رشد گونه‌های شبدر (ایرانی و برسیم) در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، نمونه‌هایی از بخش هوایی آنها در مرحله گلدهی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و در آون با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد خشک گردید. از ماده خشک هر یک از شبدرهای ایرانی و برسیم، ۵ گرم توزین و به آن ۱۵۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و ۱۲ ساعت روی همزن مکانیکی در دمای آزمایشگاه قرار گرفت. این عصاره از ۴ لایه پارچه ململ عبور داده شد، سپس با پمپ خلاء محتوى دو لایه کاغذ صاف گردید و سرانجام با عبور دادن از یک صافی نایلونی ۰/۲ میکرونی استریل شد. رقیق‌سازی عصاره‌ها با استفاده از آب مقطر انجام گرفت. سپس از هر نوع عصاره سه غلظت ۳۳/۳ گرم در لیتر (غلظت کامل یا ۱۰۰ درصد)، ۱۶/۷ گرم در لیتر (۵۰ درصد غلظت کامل) و ۸/۳ گرم در لیتر (۲۵ درصد غلظت کامل) تهیه گردید و آب مقطر نیز به عنوان شاهد (غلظت صفر عصاره) مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اینکه بسیاری از ترکیبات فلی در حلال‌های آلی (نه آب) محلولند، روش عصاره‌گیری فوق بار دیگر با استفاده از مтанول تکرار گردید تا بتوان توانایی آلوپاتی عصاره‌های آبی و آلی شبدر را با یکدیگر مقایسه نمود. با این تفاوت که این بار برای عصاره‌گیری، بجائی آب مقطر از مтанول استفاده شد. البته از آنجا که مтанول بازدارنده جوانه‌زنی بذر است، پس از افزودن ۷ میلی لیتر از هر یک از غلظت‌های مختلف عصاره آلی به هر پتری، مтанول در دستگاه لامینار تبخیر و کاغذ صافی درون پتری خشک شد. سپس به هر پتری ۷ میلی لیتر آب مقطر استریل اضافه شد. جهت تعیین اثر غلظت عصاره‌ها بر جوانه‌زنی بذر علفهای هرز، ابتدا بذر پیچک، تاجخروس، چاودار و خردل وحشی ۵ دقیقه در محلول سدیم‌هیپوکلریت تجاری قرار گرفتند. سپس ۱۰ دقیقه با آب معمولی شسته و در هوا خشک شدند. در ادامه، ۲۵ بذر از هر گونه علف‌هرز در ظروف پتری محتوى کاغذ صافی مرطوب شده با ۸ میلی لیتر عصاره قرار گرفت. پتری‌ها در تاریکی و دمای ۲۷ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از دو هفته درصد جوانه‌زنی بذور تعیین شد. ملاک جوانه‌زنی، خروج ریشه‌چهای

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبدر ایرانی و برسمی بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خرروس، چاودار و خردل وحشی

حدود ۷ میلی‌متری بود (White *et al.*, 1989).

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش گونه‌های شبدر (دو گونه: شبدر ایرانی و برسمی) به عنوان فاکتور A، گونه علف‌های هرز (۴ گونه: پیچک، تاج‌خرروس، چاودار و خردل وحشی) به عنوان فاکتور B، نوع عصاره (آبی و آلی) به عنوان فاکتور C و غلط‌ت عصاره (چهار غلط) به عنوان فاکتور D در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش تجزیه واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد.

نتیجه و بحث

نتایج نشان داد که از نظر جوانه‌زنی بذر، بین گونه‌های شبدر، بین گونه‌های علف‌هرز، بین نوع عصاره، و بین غلط‌ت‌های مختلف عصاره، تفاوت بسیار معنی‌داری وجود دارد. همچنین اثرات متقابل آن‌ها نیز بسیار معنی‌دار بود (جدول ۱). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بین گونه‌های شبدر ایرانی و برسمی از نظر توانایی آلوپاتی و ممانعت از جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز تفاوت معنی‌داری وجود دارد (جدول ۲). در عصاره آبی شبدر ایرانی، جوانه‌زنی بذر پیچک دارای بیشترین و بذر چاودار دارای کمترین درصد بود (به ترتیب ۶۳ و ۴۵/۸ درصد). اما در عصاره آلی شبدر ایرانی، بذر علف‌های هرز تاج‌خرروس و چاودار با ۸/۳۳ و ۸/۳۳ درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی را به خود اختصاص دادند. در عصاره آبی شبدر برسمی، بذر علف‌های هرز پیچک و چاودار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی (۷۵/۸۳ و ۶/۹۱ درصد) بودند و در عصاره آلی آن نیز بذر علف‌های هرز مذکور در مقایسه با دو گونه دیگر، وضعیت مشابهی داشتند (جدول ۲).

بین دو نوع عصاره آبی و آلی از نظر اثر بر جوانه‌زنی بذر گونه‌های علف‌هرز مورد بررسی، تفاوت معنی‌داری ملاحظه شد (جدول ۳). بطور کلی عصاره آلی در مقایسه با عصاره آبی اثر بازدارندگی بیشتری بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز داشت. در هر دو نوع عصاره گونه‌های شبدر ایرانی و برسمی، با افزایش غلط‌ت عصاره، میانگین درصد جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز کاهش یافت. در مجموع در بین غلط‌ت‌های مختلف دو نوع عصاره، عصاره آبی

شبدر ایرانی با غلظت $\frac{33}{3}$ گرم در لیتر (غلظت کامل) بیشترین تأثیر را در کاهش جوانهزنی بذر علف‌های هرز داشت (با میانگین $\frac{11}{33}$ درصد جوانهزنی و $\frac{83}{5}$ درصد کاهش نسبت به شاهد) که از این نظر با عصاره آلی شبدر بررسیم در غلظت مشابه، تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۳).

بین غلظت‌های مختلف عصاره از نظر تأثیر بر درصد جوانهزنی بذر گونه‌های علف‌هرز مورد بررسی، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (جدول ۴). غلظت $\frac{33}{3}$ گرم در لیتر (غلظت کامل) با $\frac{15}{58}$ درصد و پس از شاهد، غلظت $\frac{8}{3}$ گرم در لیتر ($\frac{25}{25}$ درصد غلظت کامل) با $\frac{37}{89}$ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین درصد جوانهزنی بذر را به خود اختصاص دادند. غلظت $\frac{33}{3}$ گرم در لیتر (غلظت کامل) عصاره شبدر بررسیم کاملاً مانع جوانهزنی بذر علف‌های هرز تاج‌خروس و خردل وحشی گردید، در حالی که غلظت مذکور از عصاره شبدر ایرانی، بازدارنده کامل جوانهزنی بذر گونه‌های چاودار و خردل وحشی بود. البته بین غلظت‌های $\frac{33}{3}$ (غلظت کامل) و $\frac{50}{50}$ درصد غلظت کامل) عصاره شبدر ایرانی و بررسیم از نظر اثر بازدارندگی بر جوانهزنی بذر خردل وحشی تفاوت معنی‌داری ملاحظه نشد و هر دو غلظت مذکور کاملاً مانع جوانهزنی بذر این علف‌هرز شدند. البته بذر خردل وحشی حتی در غلظت $\frac{8}{3}$ گرم در لیتر ($\frac{25}{25}$ درصد غلظت کامل) عصاره شبدر بررسیم نیز جوانهزنی بایینی داشت و جوانهزنی آن نسبت به شاهد $\frac{95}{4}$ درصد کاهش یافت. اما علف‌هرز پیچک حتی در غلظت $\frac{33}{3}$ گرم در لیتر (غلظت کامل) عصاره شبدر بررسیم در مقایسه با سه گونه دیگر از جوانهزنی بمراتب بالاتری برخوردار بود و جوانهزنی آن نسبت به شاهد تنها $\frac{34}{8}$ درصد کاهش نشان داد (جدول ۴).

بررسی پتانسیل آلوپاتری شبدار ایرانی و برسمی بر جوانهزنی بذر علفهای هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی

جدول ۱- تجزیه واریانس درصد جوانهزنی بذر

Table 1- Analysis of variance for percentage of seed germination

Source of variation	Degree of freedom	Mean of Squares
clover species	1	1547.005**
weed species	3	31619.936 **
extract type	1	1050.005 **
extract concentration	3	23417.936 **
clover species x weed species	3	1809.061 **
clover species x extract type	1	2153.380 **
clover species x extract concentration	3	481.505 **
weed species x extract type	3	400.922 **
weed species x extract concentration	9	3580.630 **
extract type x extract concentration	3	621.700 **
clover species x weed species x extract type	3	1593.991 **
clover species x weed species x extract concentration	9	288.709 **
clover species x extract type x extract concentration	3	230.991 **
weed species x extract type x extract concentration	9	464.764 **
clover species x weed species x extract type x concentration	9	276.380 **
Error	128	7.109
Coefficient of Variation (C.V) = 7.27%	Significant at 1% level **	

جدول ۲- مقایسه میانگین های درصد جوانه زنی بذر گونه های شبدر و اثر مقابل

گونه شبدر × گونه علف هرز × نوع عصاره

Table 2- Mean comparison of seed germination percentage for clover species and
clover species × weed species × extract type interaction

میانگین درصد جوانه زنی Mean of seed germination (%)	نوع عصاره Extract type	گونه علف هرز Weed species	گونه شبدر Clover species
63.00 ^c	Aqueous	<i>Convolvulus arvensis</i>	
63.66 ^c	Methanolic		
53.66 ^c	Aqueous	<i>Amaranthus retroflexus</i>	<i>T. resupinatum</i>
69.83 ^b	Methanolic		
4.58 ^k	Aqueous	<i>Secale cereale</i>	
8.33 ^j	Methanolic		
32.83 ^f	Aqueous	<i>Sinapis arvensis</i>	
20.33 ^h	Methanolic		
Mean = 39.53 ^a			
75.83 ^a	Aqueous	<i>Convolvulus arvensis</i>	
57.00 ^d	Methanolic		
51.83 ^e	Aqueous	<i>Amaranthus retroflexus</i>	<i>T. alexandrium</i>
25.00 ^g	Methanolic		
6.91 ^j	Aqueous	<i>Secale cereale</i>	
10.50 ⁱ	Methanolic		
23.58 ^g	Aqueous	<i>Sinapis arvensis</i>	
20.16 ^h	Methanolic		
Mean = 33.85 ^b			

تفاوت میانگین هایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند در سطح

۵ درصد معنی دار نیست.

Means followed by similar letter in each column are not significantly different at 5% level.

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبدر ایرانی و برسم بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خروس، چاودار و خردل وحشی

جدول ۳- مقایسه میانگین‌های درصد جوانه‌زنی بذر برای نوع عصاره و اثر متقابل
گونه شبدر × نوع عصاره × غلظت عصاره

Table 3- Mean comparison of seed germination percentage for extract type and clover species × extract type × extract concentration interaction

Reduction of seed germination as compare to control (%)	میانگین درصد درصد کاهش نسبت به شاهد	جوانه‌زنی Mean of seed germination (%)	غلظت عصاره Extract concentration	گونه شبدر Clover species	نوع عصاره Extract type
-	69.08 ^a	Control	T. resupinatum	Aqueous	Mean=39.03 ^a
30.2	48.16 ^c	8.3 g/L			
63.0	25.50 ^f	16.7 g/L			
83.5	11.33 ^j	33.3 g/L			
-	69.08 ^a	Control	T. alexandrium	Methanolic	Mean=34.35 ^b
40.2	41.25 ^d	8.3 g/L			
53.6	32.00 ^e	16.7 g/L			
77.0	15.83 ⁱ	33.3 g/L			
-	65.16 ^b	Control	T. resupinatum		
34.7	42.50 ^d	8.3 g/L			
51.4	31.66 ^e	16.7 g/L			
64.9	22.83 ^g	33.3 g/L			
-	64.16 ^b	Control	T. alexandrium		
69.3	19.66 ^h	8.3 g/L			
74.2	16.50 ⁱ	16.7 g/L			
80.7	12.33 ^j	33.3 g/L			

تفاوت میانگین‌هایی که در هر سهون حداقل دارای یک حرف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد معنی‌دار نیست.

Means followed by similar letter in each column are not significantly different at 5% level.

فریبا میقانی، جواد خلقانی، مهلا قربانی و مرتضی نجف پور

محل قرارگیری جدول ۴ که Landscape است.

بررسی پتانسیل آللوپاتی شبدر ایرانی و بررسیم بر جوانهزنی بذر علفهای هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل و حشی

محل قرارگیری ادامه‌ی جدول ۴ که Landscape است.

فریبا میقانی، جواد خلقانی، مهلا قربانی و مرتضی نجف پور

محل قرارگیری ادامه‌ی جدول ۴ که Landscape است.

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبدر ایرانی و برسمی بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خروس، چاودار و خردل وحشی

محل قرارگیری ادامه‌ی جدول ۴ که Landscape است.

گونه‌های علف‌هرز مورد بررسی از نظر درصد جوانه‌زنی بذر در حضور عصاره‌های شبدر ایرانی و برسیم، واکنش‌های متفاوتی نشان دادند (جدول ۵). در این میان، پیچک با ۶۴/۸۷ و چاودار با ۷/۵۸ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین جوانه‌زنی را نشان دادند. اگرچه چاودار در مجموع دارای کمترین درصد جوانه‌زنی بود، اما درصد جوانه‌زنی آن حتی در غلظت صفر عصاره (شاهد آب مقطر) نیز بسیار پایین بود (۱۶/۶۶ درصد) و لذا غلظت‌های مختلف عصاره تأثیر چندانی بر کاهش جوانه‌زنی آن نداشت. بنابراین، خردل وحشی در مقایسه با سه گونه دیگر بیشترین تأثیرپذیری را در مقابل غلظت‌های مختلف عصاره داشت، بطوری که در غلظت‌های ۳۳/۳ (غلظت کامل)، ۱۶/۷ (درصد غلظت کامل) و ۸/۳ گرم در لیتر (درصد غلظت کامل) عصاره آلی فاقد جوانه‌زنی بود و در مقایسه با شاهد (با ۸۱ درصد جوانه‌زنی در آب مقطر) ۱۰۰ درصد کاهش نشان داد. همچنین تاج خروس نیز در غلظت ۳۳/۳ گرم در لیتر (غلظت کامل) عصاره آبی فاقد جوانه‌زنی بود و این فرایند در مقایسه با شاهد (با ۸۵/۲۳ درصد جوانه‌زنی در آب مقطر) ۱۰۰ درصد کاهش یافت (جدول ۵). بطورکلی، نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره‌های شبدر برسیم در مقایسه با شبدر ایرانی اثر بیشتری بر کاهش جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز دارد. همچنین در بین گونه‌های علف‌هرز، بیشترین درصد کاهش جوانه‌زنی نسبت به شاهد، مربوط به خردل وحشی و کمترین آن مربوط به پیچک بود. در بین دو نوع عصاره مورد آزمایش نیز عصاره آلی در مقایسه با عصاره آبی تأثیر بیشتری بر کاهش جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز داشت. همچنین در بین غلظت‌های مختلف عصاره، غلظت ۳۳/۳ گرم در لیتر (غلظت کامل) بیشترین اثر بازدارنده‌گی را بر جوانه‌زنی داشت.

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبدر ایرانی و برسم بروانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خروس، چاودار و خردل وحشی

محل قرارگیری جدول ۵ که Land scape است.

فریبا میقانی، جواد خلقانی، مهلا قربانی و مرتضی نجف پور

محل قرارگیری ادامه‌ی جدول ۵ که Land scape است.

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبدار ایرانی و برسمی بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خروس، چاودار و خردل وحشی

محل قرارگیری ادامه‌ی جدول ۵ که Land scape است.

فریبا میقانی، جواد خلقانی، مهلا قربانی و مرتضی نجف پور

محل قرارگیری ادامه‌ی جدول ۵ که Land scape است.

همانطور که مشاهده شد، با افزایش غلظت عصاره‌ها، درصد جوانهزنی بذر علف‌های هرز کاهش یافت. توانایی آلوپاتی و تولید آلوکمیکال‌ها در شبدر برسمی به اثبات رسیده است (Williams *et al.*, 1998). در یک بررسی مشاهده شد که عصاره آبی ساقه شبدر سفید، جوانهزنی و رشد گیاهچه تاج خروس و خردل وحشی را بازمی‌دارد. با افزایش غلظت عصاره آبی شبدر برسمی و ماشک گل خوش‌ای، رشد گیاهچه و جوانهزنی ذرت، نیلوفر پیچ و خردل وحشی، کاهش یافت. بیشترین بازارندگی جوانهزنی بذر در خردل وحشی مشاهده شد (Qasem, 1995) که با نتایج پژوهش حاضر مبنی بر حساسیت بیشتر بذر خردل وحشی به آلوکمیکال‌های گونه‌های شبدر مورد بررسی، مطابقت دارد. در بررسی دیگری نیز به اثبات رسید که بقایای شبدر قرمز و شبدر زیرزمینی، مانع رشد و جوانهزنی تعدادی از علف‌های هرز می‌شوند و این پدیده را به توانایی آلوپاتی شبدر نسبت دادند (Enache & Ilnicki, 1988). به گزارش Williams *et al.* (1998) در حضور بقایای شبدر برسمی، به علت وجود آلوکمیکال‌ها، از بیomas و تراکم علف‌های هرز سلمه تره، تاج خروس و چچم کاسته می‌شود. بنابر گزارش White *et al.* (1998) ایزوفالوونوییدهای تولید شده از برگ و ساقه شبدر قرمز و برسمی در خاک به ترکیبات فنلی تجزیه می‌شوند که مانع رشد علف‌های هرز می‌گردند. در بررسی دیگری نیز نشان داده شد که بقایای شبدر قرمز و شبدر زیرزمینی، مانع جوانهزنی و رشد تاج خروس و خردل وحشی می‌شوند (Enache & Ilnicki, 1988) و آن را به توانایی آلوپاتی این گونه‌ها نسبت دادند. زمان لازم برای سبز شدن تاج خروس در حضور بقایای اضافه شده به خاک شبدر قرمز، ۳ تا ۴ روز به تأخیر می‌افتد. شبدر زیرزمینی نیز توانایی بالای برای کنترل علف‌های هرز دارد (Rice, 1995). Lehman & Blum (1997) اثر بقایای شبدر برسمی را بر جوانهزنی بذر تاج خروس مورد بررسی قرار دادند و دریافتند این پدیده تحت تأثیر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و مقدار نیتروژن خاک قرار می‌گیرد.

نتایج حاصل از کرومتوگرافی، ترکیبات فنلی را بعنوان عوامل مسئول آلوپاتی شبدر معرفی نمودند (Qasem, 1995). شبدر ترکیبات فراری تولید می‌نماید که جوانهزنی و رشد چند گونه علف‌هرز را باز می‌دارد و با استفاده از کرومتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی، ترکیبات متعددی مانند هیدروکربن، الکل، آلدید، کتون، استر، فوران‌ها و منوتربن‌ها، شناسایی

شده‌اند. ترکیبات فرار، آللوکمیکال‌های مهم و بسیار مؤثری در پدیده آللوباتی اند که هنوز بطور کامل شناسایی نشده‌اند. کاهش رشد علف‌های هرز به میزان تولید آللوکمیکال‌ها، گونه گیاه پوششی و سیستم مدیریت بستگی دارد (Rice, 1995).

واکنش علف‌های هرز مورد بررسی به اثرات آللوباتی دو گونه شبدر مورد مطالعه، متفاوت بود. زیرا، تفاوت‌هایی از نظر اثر دو گونه شبدر بر جوانه‌زنی این علف‌های هرز، مشاهده گردید. بدین ترتیب، طبق نظر (Qasem, 1995) آللوباتی یک مکانیسم انتخابی است (Hoffman *et al.*, 1996) اثر آللوباتی شبدر بررسیم را بر جوانه‌زنی بذر، طول ریشه‌چه و هیپوکوتیل علف‌های هرز تاج خروس و گاوپنه مورد ارزیابی قرار دادند و مشاهده کردند رشد آن‌ها کاهش می‌یابد. مشابه نتایج پژوهش حاضر، پاسخ مشاهده شده، به گونه علف‌هرز بستگی داشت.

از سوی دیگر ملاحظه کردیم که اثرات بازدارندگی عصاره‌های "آلی" بر جوانه‌زنی و رشد علف‌های هرز بیشتر از عصاره‌های "آبی" بود. علت این تفاوت را می‌توان چنین توجیه نمود که احتمالاً بخش اعظم آللوکمیکال‌های شبدر، در حالاتی آلی مانند متابولول محلول و مقدار ترکیبات محلول در آب، کمتر است.

در مجموع هر دو گونه شبدر ایرانی و بررسیم، مواد بازدارنده‌ای آزاد می‌کنند که بنظر می‌رسد اهمیت اکولوژیکی چشم‌گیری در کنترل علف‌های هرز دارد. کاهش درصد جوانه‌زنی علف‌های هرز در پاسخ به عصاره شبدر ایرانی و بررسیم، به گونه گیاه پوششی، گونه علف‌هرز، غلظت عصاره و نوع عصاره بستگی دارد. در هر صورت، بهره‌گیری از بقایای شبدر ایرانی و بررسیم برای کنترل علف‌های هرز، روش مناسبی پیشنهاد می‌گردد. گفتنی است که هر چند طبق بررسی‌های انجام گرفته (Masiunas *et al.*, 1995)، توانایی آللوباتی و در نتیجه کنترل علف‌های هرز بوسیله بقایای شبدر به علت تجزیه آن‌ها طی ۱-۲ ماه، کاهش می‌یابد، اما همین زمان نیز برای کنترل علف‌های هرز مناسب بنظر می‌رسد. در پایان، با توجه به توانایی بیشتر شبدر بررسیم (در مقایسه با شبدر ایرانی) از نظر کنترل علف‌های هرز و حساسیت بیشتر خردل وحشی نسبت به اثر عصاره‌های این دو گونه شبدر (بویژه شبدر بررسیم)، بررسی دیگری در مزرعه با استفاده از بقایای شبدر بررسیم بصورت مالج طبیعی برای کنترل علف‌های هرز و

بررسی پتانسیل آلوپاتی شبد ایرانی و برسم بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز پیچک، تاج‌خروس، چاودار و خردل وحشی

بویژه خردل وحشی پیشنهاد می‌گردد تا بدین ترتیب بتوان به نتیجه نهایی درباره کارایی استفاده از این مالج جهت کنترل علف‌های هرز مشکل‌سازی مانند خردل وحشی، دست یافت.

نشانی نگارنده‌گان: فریبا میقانی و جواد خلقانی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، صندوق پستی ۱۴۵۴، تهران ۱۹۳۹۳، ایران؛ مهلا قربانلی و مرتضی نجف‌پور، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

فریبا میقانی، جواد خلقانی، مهلا قربانی و مرتضی نجف پور