

گزارش های کوتاه علمی

اولین گزارش زنبور پارازیتویید *Metaphycus pulvinariae*(Howard)(Hym.:Encyrtidae) از ایران. آزاده داوودی، علی اصغر طالبی، غلامرضا رجبی، یعقوب فتحی پور و زیهونگ زو. گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش حشرات زیان آور، موسسه حشره شناسی کاربردی، دانشکده کشاورزی و بیوتکنولوژی، دانشگاه زیستان، چین.

مطالعاتی جهت شناسایی زنبورهای پارازیتویید شپشک های نرم تن در بهار سال ۱۳۸۲ صورت گرفت. در این بررسی، نمونه هایی از شپشک *Didesmococcus unifasciatus* (Arch.) از روی درختان بادام در منطقه شند آباد تبریز طی خرداد ماه جمع آوری گردید. ساقه های حاوی شپشک به ظروف مخصوص در شرایط اتاق منتقل شده و زنبورهای خارج شده از آنها در اتیل الکل ۷۵ درصد قرار گرفتند. در بین این زنبورها، تعدادی زنبور پارازیتویید *Zhihong Xu* از خانواده Encyrtidae مشاهده شد. این گونه توسط *Metaphycus pulvivariae* مورد شناسایی قرار گرفت و با توجه به منابع موجود برای اولین بار از ایران گزارش میگردد. برخی از خصوصیات مهم مرفلولوژیک آن به شرح زیر میباشد:

حشره ماده به طول ۰/۹ تا ۱/۱ میلی متر؛ رنگ عمومی زرد روشن، سطح پشتی بدن کمی تیره تر از سطح شکمی؛ شاخکها ۱۱ بندی، چهار بند اول فونیکول و نیمه ابتدایی گرز به رنگ قهوه ای، پالپ آرواره پایین سه بندی؛ در ناحیه قفسه سینه دارای شیار نوتائولی مشخص اما ناقص؛ بال جلو بدون رنگ، اسپکولوم در قاعده بسته.

حشره نر به طول ۰/۸ تا ۱ میلیمتر، سطح پشتی بدن کمی تیره تر از حشره ماده، شاخک ها ۹ بندی، بندهای فونیکول قهوه ای رنگ، سایر خصوصیات شبیه حشره ماده میباشد.

اولین گزارش زنبور از *Moranila californica* (Howard) (Hym.: Pteromalidae)

ایران. آزاده داویدی، علی اصغر طالبی، غلامرضا رجبی، یعقوب فتحی پور، ولی ا... رضایی و هانس باور. گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش حشرات زیان آور، تهران. بخش بی مهرگان، موزه تاریخ طبیعی، سوئیس.

بررسی هایی جهت شناسایی زنبورهای پارازیتوئید شپشک های نرم تن در تهران و استانهای شمالی طی سال ۱۳۸۱ صورت گرفت. به این منظور برگها و ساقه های گیاهان مختلف آلوده به شپشک های نرم تن جمع آوری و به ظروف مخصوص نگه داری در درجه حرارت اتاق منتقل شدند، زنبورهای خارج شده از آنها در اتیل الکل ۷۵ درصد قرار گرفتند. در میان نمونه ها، تعدادی زنبور ماده *Moranila californica* متعلق به خانواده Pteromalidae از دو شپشک (*Ceroplastes floridensis* Comstock و *Saissetia oleae* (Olivier) جمع آوری شده از گیلان (رودبار)، خارج شده و توسط Hannes Baur در بخش بی مهرگان موزه تاریخ طبیعی سوئیس مورد شناسایی قرار گرفتند. لاروهای زنبور *M. californica* شکارگر بوده و از تخمر دو شپشک مذکور تغذیه میکنند. طبق منابع موجود این گونه برای اولین بار از ایران گزارش میگردد و ماده بالغ آن دارای خصوصیات زیر میباشد:

طول بدن ۲-۲/۲ میلی متر، رنگ عمومی قهوه ای تیره مایل به سیاه، سرقوته ای روشن، شاخک ۱۰ بندی که کمی بالاتر از قطعات دهانی قرار گرفته است، قفسه سینه محدب با جلای فلزی، بال جلو دارای یک هاله تیره رنگ در نیمه انتهایی، سلول کناری با ۱۰ موی مشخص، رگ زیرکناری بلند نو انحنیدار، دارای حداقل هشت موی بلند و ضخیم، بند دوم شکم بلند که طول آن از مجموع طول سایر بندها بیشتر میباشد.

گزارش زنبور (Eurytoma acroptilae Zerova, 1986 (Eurytomidae) پارازیتوئید مگس گلنگ از ایران. بابک قرالی، مارینا زرووا. بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام. بخش سیستماتیک حشره خوارها، موسسه جانورشناسی شمالهazan، کیف. اکراین

با نگهداری غوزه های آلوده به مگس گلنگ در ظروف پرورش، تعدادی زنبور پارازیتوئید از خانواده Eurytomidae به دست آمد. غوزه ها از مزارع گلنگ شهرهای دهلران (۸۱/۱۳۱)، دره شهر (۸۱/۲/۱۱) و شیروان چرداول (۸۲/۳/۱۷) جمع آوری گردیدند. این نمونه ها با نام علمی Eurytoma acroptilae تشخیص داده شدند. حشرات کامل این پارازیتوئید همزمان با مگس گلنگ در مزارع ظاهر گردیده و تخمهای سیاه و پایه دار خود را در داخل غوزه ها قرار میدهند لاروها پس از خروج به صورت خارجی از لاروهای مگس تغذیه کرده و آنها را کاملا از بین میبرند. میزانهای این زنبور در استان ایلام عبارتند از :

1. Acanthiophilus helianthi (Rossi)
2. Chaetorellia carthami Stackelberg
3. Terellia luteola Robineau-Desvoidy
4. Urophora mauritanica Macquart

که همگی از خانواده Tephritidae بوده و لاروهای آنها به غوزه های گلنگ حمله می کنند. این زنبور اولین بار در کشور اکراین از روی علف هرز (L. repens) آلوده به جنسهای Trupanea و Urophora، Acanthiophilus از روی این علف گردیده است.

گزارش ۱۵ گونه زنبور پارازیتوئید و یک گونه زنبور هپرپارازیتوئید (Chalcidoidea : Pteromalidae & Encyrtidae) برای فون ایران. حسن قهاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

براساس نمونه برداریهای انجام شده از آفات مختلف طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۸ در مناطق مختلف استانهای مازندران و گلستان و پرورش آنها در شرایط محیطی مطلوب (دمای

± 1 درجه سانتيگراد، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و ۱۴ ساعت روشنایی در شبانه روز) ، ۱۵ گونه زنبور پارازیتوئید از دو خانواده *Pteromalidae* و *Encyrtidae* (Chalcidoidea) و یک گونه زنبور هیپرپارازیتوئید از خانواده *Pteromalidae* جمع آوری و شناسایی گردیدند.

زنبورهای پارازیتوئید در ۱۱ جنس مختلف و شامل جنس‌های :

Cheiropachus Westwood, 1828; *Cryptogaster* Walker, 1833 (= *Polycystus* Westwood, 1828)
Cryptoptyx Dellucchi, 1956; *Homalotylus* Mayr, 1982; *Halticoptera* Spinola, 1811;
Dibrachoides Kurdjumov, 1913; *Pteromalus* Swederus, 1795 (= *Gerontidiella* Szelenyi,
Pachyneuron Walker, 1833); *Trichomalopsis* Crawford, 1913 (= *Sphegigaster* Spinola, 1811;
Habrocytus Thompson, 1878); *Urolepis* Walker, 1846, *Eupteromalus* Kardjumov, 1913).

و زنبور هیپرپارازیتوئید نیز در جنس *Euneura* Walker, 1844 (= *Gygaxia* Dellucchi, 1955) قرار داشتند. نمونه های زنبور پس از شناسایی مقدماتی ، مورد تایید دکتر بوچک در موزه حشره شناسی لندن قرار گرفتند. زنبورهای شناسایی شده در پژوهش حاضر عبارتند از :

الف - خانواده Pteromalidae

۱. *Cheiropachus quadrum* (Fabricius) پارازیتوئید لارو سوسک چوبخوار

از روی درخت هلو *Rugoloscolytus mediterraneus* (Col.: Scolytidae) Egg.

۲. *Dacus ciliatus* Lowe (Diptera : *Cryptoptyx latipes* (Rondani) پارازیتوئید شفیره مگس

از روی کدو Tephritidae)

۳. *Adleria caputmedusae* (Hart.) پارازیتوئید شفیره زنبور گالزاری *Cryptoptyx robustus* (Masi)

از روی درخت بلوط (Cynipidae Hym.:)

۴. *Ragoletis ceraci* L. پارازیتوئید شفیره مگس *Cryptogaster clavicornis* Walker

از روی درخت گیلاس (Dip.:Tephritidae)

۵. *Hypera* (Gyll.) پارازیتوئید شفیره سوسک *Dibrachoides dynastes* (Foerster)

از روی یونجه (Curculionidae Col.:) *variabilis*

۶. *Aphidius ervi* Hal. (Hym.: Aphidiidae) هیپرپارازیتوئید زنبور *Euneura lachni* Ashmead

از روی شته. *Acyrtosiphon pisum* Hart. و از روی گیاه لوپیا

- Agromyza alnibetula* پارازیتوئید لارو مگس مینوز *Halticoptera flavicornis* Spinola .۷
 از روی درخت صنوبر (Agromyzidae Dip.:) Hend.
- Nipaecoccus vastator* Mask. پارازیتوئید شپشک *Pachyneuron grande* Thompson .۸
 از روی خرزهه (Pseudococcidae Hom.:)
- Nipaecoccus viridis* (News.) پارازیتوئید شپشک *Pachyneuron planiscuta* Thompson .۹
 از روی درخت توت سفید (Pseudococcidae Hom.:)
- Vanessa* (Lep.: Nymphalidae). پارازیتوئید شفیره پروانه *Pteromalus cardui* (Erdos) .۱۰
 از روی سویا *cardui* L
- Pieris brassicae* (Lep.: Pieridae) پارازیتوئید شفیره پروانه *Pteromalus elevatus* (Walker) .۱۱
 از روی کلم (L.)
- Papilio machaon* L. پارازیتوئید شفیره پروانه *Pteromalus microps* Graham .۱۲
 از روی هوبیج (Lep.: Papilionidae)
- Agromza schineri* (Gir.) Sphegigaster stepicola Boucek .۱۳
 از روی درخت صنوبر (Dip.: Agromyzidae)
- Ragoletis cerasi* L. پارازیتوئید لارو مگس *Trichomalopsis peregrina* (Graham) .۱۴
 از روی توت فرنگی (Dip.: Tephritidae)
- Ephydria* (Dip.: Ephydriidae) پارازیتوئید لارو مگس *Urolepis maritima* (Walker) .۱۵
 از روی برنج *afghanica*
- ب - خانواده Encyrtidae**
- Exochomus* پارازیتوئید لارو کفشدوزک *Homalotylus ephippium* Ruschka
 (Col.: Coccinellidae) *pubescens* Kust.

تمام پارازیتوئیدها و هیپرپارازیتوئیدهای مذکور و نیز برخی از میزبانهای آنها، در کلکسیون حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران موجود میباشند.

گزارش سه گونه و دو جنس جدید شپشک آرد آلود (Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) برای فون ایران. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش تحقیقات رده بندی حشرات.

از میان نمونه برداریهایی که در سالهای ۱۳۸۰ - ۱۳۷۹ در استانهای جنوبی ایران انجام شد، سه گونه شپشک آرد آلود شناسایی گردید. با توجه به منابع موجود، این سه گونه برای اولین بار از ایران گزارش میگردد.

- در نامه انجمن حشره شناسی ۱۳۷۷، جلد هیجدهم شماره های ۱ و ۲ تحت عنوان شپشک آرد آلود روی میوه آناناس وارداتی از کشور کنیا گزارش گردیده بود، در حال حاضر این گونه توسط آقای آچاک از مرکز تحقیقات کشاورزی ایرانشهر در اسفند ۱۳۷۹ از ریشه یونجه جمع آوری گردیده است.

(گونه و جنس جدید)- این شپشک در چابهار و مناطق اطراف آن روی تعدادی از گیاهان گرسنگی و نیمه گرسنگی گسترش دارد میزان خسارت آن روی بعضی از گیاهان در جنوب ایران قابل توجه است. گیاهان میزبان شامل *Cordia myxa*, *Myrtus communis*, *Psidium guajava*, *Albizia sp.* در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۴ و شهرستان چابهار جمع آوری گردیده است.

(گونه و جنس جدید)- این گونه از استان هرمزگان، جزیره قشم، بند حاج علی روی تنہ درخت کهور *Prosopis spicigera* در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۶ توسط نگارنده جمع آوری گردید.