

نگارش منصور عبائی

فهرستی از سوسکهای شاخك بلند (Cerambycidae) ایران و مناطق انتشار آنها

نظر به موقعیت خاص جغرافیائی ایران و وجود اقلیمهای متفاوت، فون سوسکهای شاخك بلند ایران مانند سایر حشرات دیگر این منطقه بسیار متنوع و متغیر میباشد بنحوی که متخصصین این رشته از ۱۰۰۰-۱۲۰۰ گونه‌ای که برای منطقه Palearctic ذکر مینمایند ۳۰۰ گونه آن را مربوط به ایران میدانند.

برای سوسکهای شاخك بلند ایران اولین بار در نشریه «آفات و بیماریهای گیاهی» شماره ۱۰ سال ۱۳۲۹ آقای میرزایانس فهرستی شامل ۳۹ گونه موجود در آزمایشگاه آنزمان منتشر نمودند. از آن تاریخ تاکنون با جمع آوری نمونه‌های جدید از نواحی مختلف این تعداد افزایش یافته و گونه‌های جدیدی نیز به نمونه‌های قبلی اضافه گردیده بطوریکه در فهرست حاضر ۱۰۸ گونه آورده شده و امیدواریم که در آینده با جمع آوری بیشتر نمونه‌ها بتوانیم فون این حشرات را تکمیل نمائیم.

تشخیص قسمتی از نمونه‌های این فهرست قبلاً توسط آقای میرزایانس صورت گرفته بود و قسمتی نیز با همکاری مشارالیه و مراجعه به کتب و نشریات مختلف تعیین گردید.

از آنجائیکه تشخیص کلیه نمونه‌ها امکان پذیر نبود تعدادی از آنها بمنظور تشخیص و یا تأیید (نمونه‌های مشکوک) جهت متخصصینی چون آقای دکتر *لئو هیروفسکی* به چکوسلواکی (پراگ) و آقای دکتر *ویلیمر* به فرانسه (پاریس) ارسال گردید که در بین نمونه‌های فرستاده شده به چکوسلواکی پنج گونه و یک آیراسیون جدید تشخیص داده که در نشریه شماره ۲۶ ضمن سایر نمونه‌های دیگر که توسط این متخصص نامگذاری شده بود به چاپ رسید و در بین نمونه‌های ارسالی به پاریس یک جنس و یک گونه جدید بنام (*Iranobrium davatchii* Villiers, 1966) توسط آقای *ویلیمر* تشخیص داده شد.

ضمناً بایستی یادآوری نمود که آقای *ویلیمر* در سال ۱۳۴۴ ضمن مسافرت به قسمتهای مشرق و جنوب ایران تعدادی از سوسکهای این خانواده را جمع آوری نمودند که پس از مراجعت به پاریس همراه با

سایر نمونه‌های دیگر نشریه‌ای تحت عنوان :

"Contribution à la Faune de l'IRAN Coleoptères Cerambycidae (1967)" منتشر کرده‌اند که در آن ضمن اشاره به جنس و گونه جدید فوق‌یک جنس و دو گونه و یک زیرگونه جدید دیگر نیز معرفی نموده‌اند . ولی از نمونه‌های جدید جز گونه‌ای که بنام آقای دواچی میباشد و تعدادی از گونه‌های یادشده در لیست آقای ویلیور تاکنون جمع‌آوری نگردیده است .

در طبقه بندی سوسکهای خانواده (Cerambycidae) ایران تا آنجائیکه تشخیص داده شده ۳ تحت خانواده و ۲۸ قبیله و ۱۱۶ گونه و زیر گونه آورده شده است .


در خاتمه لازم میدانم از همکاریهای فراوان آقایان میرزایانس رئیس بخش طبقه بندی حشرات، دکتر هیروفسکی و دکتر ویلیور و سایر کارشناسانی که جمع‌آوری این حشرات را بعهده داشته‌اند صمیمانه تشکر نمایم .

(فهرست حشرات را در متن لاتین ملاحظه فرمائید)



SCALE 1:4 500 000


0 50 100 150 200 250




OAK FORESTS MIXED WITH
WILD PISTACHIOS & OTHER TREES



WILD PISTACHIO FORESTS



DESERT FORESTS



DRY SUBTROPIC FORESTS

