

مرش ایران

Meriones persicus persicus Blanford.

دو نمونه از این موش در سال ۱۳۲۵ از کاخ سعدآباد (شمیران) برای تشخیص فرستاده شد و بعداً آقای الکساندرف از کوههای قره آقاج در ارتفاع ۱۸۰۰-۱۹۰۰ متر از سطح دریا بدست آورد و همچنین در اوایل سال ۱۳۲۶ نگارنده در باغات قزوین و در نقاط دیگر مشاهده نموده است. این موش از خانواده *Muridae* و از تحت خانواده *Gerbillinae* میباشد. (۱)

مشخصات - طول بدن بین ۱۳۲ الی ۱۴۱ میلیمتر و رنگ عمومی بدن در پشت حنائی روشن و در زیر شکم سفید میباشد دم قدری از بدن درازتر ۱۴۳ الی ۱۵۵ میلیمتر است و نسبت ط-ول بدن بدم تقریباً مساوی $\frac{9}{10}$ است دم مستور از موهای کوتاه حنائی رنگ و در انتهای آن یکدسته موشکلی قلم مو برنگ تیره مخلوط با موهای سفیدرنگی وجود دارد.


گوشها بزرگ و طول آن در حدود ۱۶ میلیمتر است و در پشت گوشها لکه سفیدرنگی وجود دارد. چشمهای آن درشت است پای عقب درازتر از پاهای جلو و پنجههای پای عقب فاقد مو و طول آن ۳۰ میلیمتر و کف پنجههای پای عقب دارای برآمدگیهایی میباشد. (۲) (شکل ۳۳)

جمعده سر قدری کشیده و طول آن ۵۵-۶۰ میلیمتر است. دارای ۱۶ دندان میباشد دندانهای ثنایا زردرنگ و در وسط آن شیارزی دیده میشود. دندانهای آسیا حلقه دار و لبه های آن فاقد دندانه های تیز میباشد. دندانهای آسیای اول دارای ۳ حلقه و دوم دارای ۲ حلقه و دندان آسیای سوم فقط دارای یک حلقه است.

طرز زندگی - این موش معمولاً در مناطق کوهستانی غیر مسکون زندگی مینماید. ولی در دشتهای و باغات و مزارع نیز دیده میشود که تشکیل دسته های کوچک میدهد و بسا بطور منفرد زندگی

(۱) آرژوبرویل و بعضی از نویسندگان دیگر این خانواده را بدو خانواده *Muridae* (شامل *Rattus* و *Mus*) و خانواده *Cricetidae* (شامل *Gerbillinae* و *Calomyscus* و غیره) طبقه بندی می نمایند.

۲ - در رساله چونندگان اطراف تهران آقای دکتر روسلو وجود مودر کف پنجه پای عقب را جزء مشخصات متمایزه اینگونه میدانند در صورتیکه در نمونه های جمع آوری شده بوسیله اینجانب کف پنجه پا فاقد مو میباشد.



(ش ۳۳) - موش ایران
(Fig 33) - *Meriones persicus persicus*
(Original)

مینماید . فعالیت آن در شب میباشد لانه‌ها دارای چندین راهرو و چند عدد سوراخ خروجی است در داخل لانه آشیانه‌هایی برای سکونت خود تعبیه مینماید . از نباتات کوهستانی تغذیه میکند . نگارنده در قزوین از لانه این موش مقداری پوست پسته بدست آوردم . در سال دارای ۲ نسل می‌باشد راجع بتعداد بچه اطلاع صحیحی در دست نیست و اهمیت اقتصادی آن مطالعه نشده است .
مناطق انتشار - این موش بومی ایران محسوب و تا کنون در سعدآباد (شمیران) قره‌آقاج - ورامین - قزوین و شمال خراسان دیده شده است .

در کشور های زیر - مغرب ترکیه - افغانستان - ترکمنستان و ارمنستان شوروی نیز انتشار دارد .

Bibliographie

- 1) N. A. Bobrinski et B.A. Kuznetsov , Détermination des Mammifères de U. R. S. S. Moscou , 1944
- 2) Dr.R. Rousselot , Les rongeurs de la région de Tehran ; Fasc.5 Archives de l'Institut d'Hessarak , 1947
- 3) B.S. Vinogradov et S.P. Obolenskii , Les Mammifères nuisibles a l'Agriculture Moscou , 1932